

# NEPOREX® 2 SG

## LARVICIDA DE GRAN PERSISTENCIA



### DESCRIPCIÓN

Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones ganadera.

### USO

Aplicar sobre los suelos de la instalación ya sea en seco, esparciéndolo, o bien disuelto en agua mediante regado o pulverización.

Debe aplicarse sobre acumulaciones de materia orgánica, que es donde las moscas se posan para desovar.

#### Dosis:

→ **Esparcido en seco:** 250 g. para 10 m<sup>2</sup> de estiércol

→ **Pulverizado:** 250 g / 1-4 litros para 10 m<sup>2</sup> de estiércol

→ **Regado:** 250 g / 10 litros para 10 m<sup>2</sup> de estiércol

→ **Aplicaciones:** Las condiciones de temperatura y humedad pueden variar según la región y de un año para otro. La duración y la sincronización de los programas de control de moscas deberían ajustarse en concordancia con estas variaciones.

Neporex debe aplicarse **antes de que empiece el ciclo de la mosca**, o sea antes de que la temperatura en el interior de explotación supere los 12°C<sup>1</sup>. Según el tipo de explotación, si esta temperatura se mantiene todo el año, se recomienda el uso de Neporex durante todo el año.

<sup>1</sup>Acharya N. House fl y (*Musca domestica* L.) management in poultry production using fungal biopesticides. Doctoral Thesis, The Pennsylvania State University. 2015. Available at: [https://etda.libraries.psu.edu/files/available\\_submissions/10904](https://etda.libraries.psu.edu/files/available_submissions/10904). Accessed Jan 08, 2019.



### FORMATO

Bolsas de 5 Kg.  
Cajas de 20 Kg.



### COMPOSICIÓN

20 g de Ciromazina por Kg.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.



### VENTAJAS

- Previene eficazmente el desarrollo de las larvas.
- Facilita la lucha contra la mosca adulta
- De fácil aplicación, bien esparcido en seco o disuelto en agua.
- La ciromazina hace que las larvas tratadas no muden al estadio siguiente, provocando que el ciclo de la mosca se vea interrumpido.
- El efecto sobre la población adulta de moscas se hace visible aproximadamente 2 semanas después de la primera aplicación.

Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.

© 2021 Elanco Animal Health. PM-ES-20-0106

# Elanco

Un producto de  
**Elanco Spain SLU.**

Av. de Bruselas, 13- 2º A  
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel: 91 903 38 40

[www.elanco.es](http://www.elanco.es)

[www.conagitadetedeinventos.es](http://www.conagitadetedeinventos.es)