

MAGGOTS

Insecticida larvicida inhibidor del desarrollo de larvas y pupas



DESCRIPCIÓN

Larvicida inhibidor del desarrollo larvario. Inhibe la síntesis de quitina impidiendo el desarrollo de las larvas a adultos. Rompe el ciclo vital de los insectos. Especialmente diseñado para el control de dípteros en instalaciones ganaderas.

REGISTRO ZOOSANITARIO: 02804-P



COMPOSICIÓN

Ciromazina 2,00%



FORMATO

Envases de 5 y 10 kg



DOSIS

250g para tratar 10m²

- **Esparcido en seco:** 250 g para 10m² de superficie
- **Pulverización:** 250 g diluido en 2-3 L agua para 10m² de superficie
- **Riego o Baldeo:** 250 g diluido en 7-8 L agua para 10m² de superficie

MODO DE EMPLEO

- **Esparcido:** Purines, estiércol líquido, fosas sépticas de instalaciones ganaderas: Esparcir directamente a las dosis recomendadas.
- **Pulverizado:** Estiércol sólido, boxes, camas: Diluir en agua y aplicar.
Combinar con adulticida para un control total de los insectos. Plazo de seguridad: 6 horas. Personal profesional especializado.



VENTAJAS

- Versatilidad de uso: directo, pulverizado o riego
- Gran persistencia
- Interrumpe la muda de larvas y la pupación
- Reduce la población de insectos de manera excepcional

Bioplagen
biosecurity experts

Bioplagen SL

Avda. Castilleja de la Cuesta,
26 (PIBO)
41110 Bollullos de la Mitación
Sevilla
Tel: +34 955 77 65 77
Fax: +34 955 77 65 66
bioplagen@bioplagen.com

www.bioplagen.com