

SANIVIR SECURE

Sanivir Secure, desinfectante virucida y levuricida concentrado de uso en el entorno ganadero, de Bioplagen



DESCRIPCIÓN

- Desinfectante virucida y levuricida concentrado de uso en el entorno ganadero, de uso por personal profesional y personal especializado. Su formulación combina la acción sinérgica del cloruro de didicildimetilamonio, de gran poder detergente y efecto tensioactivo, y el ácido glicólico, que actúa sobre la materia orgánica, potenciando a su vez la acción desinfectante del glutaraldehído.
- Su formulación cumple las normas de eficacia acreditadas por ENAC: EN 1657 para actividad levuricida y EN 14675 para actividad virucida, en el área veterinaria.
- Registro Zoosanitario: 11373-P

USO

USO EXCLUSIVO EN EL ENTORNO GANADERO.

- Puede emplearse en la desinfección de superficies mediante pulverización, y por vía aérea (nebulización y termonebulización), en el entorno ganadero.
- Para la desinfección rutinaria, respetar un plazo de seguridad de 6 h en la aplicación por pulverización y de 12 h en caso de los métodos de aplicación por nebulización y termonebulización. En caso de brote, se respetará un plazo de seguridad de 12 h para el método de aplicación por pulverización, y de 36 h cuando se haga por nebulización y termonebulización. Una vez cumplidos los respectivos plazos de seguridad para cada caso, se ventilará adecuadamente el recinto antes del relevo de los animales.
- Desinfección por contacto: aplicación por pulverización. Uso por personal profesional
- Desinfección aérea: aplicación por nebulización y termonebulización. Uso exclusivo por personal especializado.

+ VENTAJAS

- Eficaz a bajas dosis.
- Versatilidad de uso.
- Respetuoso con las superficies y equipos.



COMPOSICIÓN

- Cloruro de didicildimetilamonio 10,00%
- Ácido Glicólico 7,00%
- Glutaraldehído 0,90%



FORMATO

Envases de 5 L, 20 L



DOSIS

- Desinfección rutinaria: 0,5% - 1:200 (1 L en 200 L de agua), uso por personal profesional.
- Desinfección en caso de brote: 1% - 1:100 (1 L en 100 L de agua), uso por personal profesional.
- Nebulización/termonebulización: 10% - 1:10 (1 L en 10 L de agua), uso por personal especializado.
- pH: 2,5-3,5 al 1%.

MODO DE EMPLEO

Realizar limpieza previa antes de la aplicación del tratamiento. Tanto la limpieza previa como la aplicación del tratamiento se realizarán en ausencia de animales. Aplicar diluido mediante pulverización (uso por personal profesional), nebulización o termonebulización (uso por personal especializado).



Un producto de:



Bioplagen SL

Avda. Castilleja de la Cuesta, 26
(PIBO)
41110 Bollullos de la Mitación
Sevilla
Tel: +34 955 77 65 77
Fax: +34 955 77 65 66
bioplagen@bioplagen.com

www.bioplagen.com