

PROPHYL[®] S

Biosecurity solutions

DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO DE HUVEPHARMA



DESCRIPCIÓN

Desinfectante de amplio espectro con eficacia duradera para usar frente a bacterias, levaduras, micobacterias, hongos y virus, igualmente efectivo en una solución al 2% durante 2 horas frente a oocistos de protozoos (*Eimeria* y *Cryptosporidium parvum*) y Ascaris.



COMPOSICIÓN

Clorocresol (CAS 59-50-7): 17,0 % (m/m)
Ácido glicólico (CAS 79-14-1): 4,9 % (m/m)



FORMATO

Cajas de 12 garrafas de 1 L
y de 4 garrafas de 5 L
Garrafa de 20 L y 200 L

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Primera desinfección

Diluir en agua al 1-2% y pulverizar sobre superficies y equipos a baja presión, utilizando 200-300 ml por m². Dejar actuar 30-60 minutos.
Aumentar el tiempo de contacto en bajas temperaturas.

Prevención de Coccidios y Criptosporidios

Solución al 2%. Rocíe sobre suelos y paredes previamente lavados utilizando 0,4 L/m² en suelos de cemento y 0,5 L/m² en suelos de tierra. Dejar actuar al menos 2 horas.

Remojar equipos pequeños

Solución al 1-2% dependiendo del efecto deseado. Sumergir y fregar materiales y equipos pequeños. Dejar actuar 30-60 minutos y enjuagar.

Desinfección del entorno

Prepare una solución al 2%. Pulverizar utilizando 300-500 ml/m².

Predesinfección en situación de alto riesgo

Pulverizar la solución al 2% a baja presión, utilizando 300-500 ml/m² directamente sobre las superficies. Dejar actuar 12-24 horas antes de cualquier otra intervención.

Pediluvios

Solución al 2%. Capacidad prevista de pediluvio: 10-15 L con altura mínima de 10 cm. Rellenar los pediluvios con la solución y colocar en la entrada de cada edificio. Dejar actuar mínimo 1 minuto. Cambiar la solución 1-2 veces/semana.

Vado de desinfección

Tamaño recomendado: 15-20 cm de alto, 4-6 m de largo y 4 m de ancho. Cambiar la solución 1-2 veces/semana.

Desinfección de vehículos para el transporte de animales

Deben lavarse primero con un detergente y enjuagarlos bien. Solución al 2%. Rocíar sobre el vehículo a razón de 200-400 ml/m². Dejar actuar mínimo 5 minutos.

Para áreas pequeñas

Usar un rociador equipado con una boquilla de cepillo de baja presión o una pistola de espuma.



Un producto de:



Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerp, Belgium
+32 3 288 1849

customerservice@huvepharma.com
www.huvepharma.com



VENTAJAS

- Eficacia comprobada frente a oocistos, virus, bacterias, micobacterias, hongos, ascaris y levaduras.
- Activo en presencia de materia orgánica.
- Eficacia duradera.