

GHOSTEX

INSECTICIDA GRANULADO



DESCRIPCIÓN

Larvicida en gránulo que inhibe el crecimiento de la mosca doméstica. El producto actúa sobre los huevos, larvas y pupas reduciendo hasta un 80% los niveles de población.

Nº Registro: ES/BB(MR)-2020-18-00695



COMPOSICIÓN

S-Metopreno al 0,4%



FORMATO

Bote de 5 kg.

USO

- Personal profesional especializado, personal profesional y público en general.
- Aplicación directa de los gránulos prestando atención a las áreas cercanas a los bebederos o lugares donde suele acumularse humedad.
- No aplicar de manera directa sobre los animales o cerca de bebederos o comederos pudiendo ocasionar ingestas.



MODO DE EMPLEO Y DOSIS:

Aplicar a razón de 30 gr/m².

Establos de vacas:

- **Suelo de listones:** aplicar el tercer día después de la introducción de ganado nuevo. Tratar todo el piso del pozo de estiércol. Repetir el tratamiento después de cada eliminación de estiércol.
- **Cama gruesa:** aplicar en cada nueva capa de cama y repetir el tratamiento después de cada aumento de 8 a 10 cm de la capa.

Granja avícola:

- **Jaula:** tratar el estiércol acumulado (cada capa de 10 cm de espesor) debajo de las jaulas.
- **Cama gruesa:** aplicar en cada nueva capa de cama y repetir el tratamiento después de cada aumento de 10 cm de la capa.

Estiércol almacenado al aire libre:

- Solo puede tratarse si se coloca en un pozo de estiércol a prueba de fugas, aislado y según otros requisitos de almacenamiento seguro de estiércol. Dejar de tratar al menos dos meses antes de extender el estiércol en los campos.

La aplicación sobre estiércol en redil de cabras y ovejas no está autorizada. Tener en cuenta el ciclo de vida y las características de los insectos objetivo para adaptar los tratamientos. Evitar el uso continuo del producto y alternar con productos que contengan sustancias activas con un modo de acción diferente (para eliminar individuos resistentes). Ambientes con mucha agua pueden reducir su eficacia.



VENTAJAS

- Interfiere el ciclo de vida del insecto y evita que alcance la fase adulta o se reproduzca.
- Eficacia prolongada de hasta 3 meses.
- Puede utilizarse en un programa de rotación para alternar ante problemas de resistencia a piretroides.



Un producto de:



Pelsis Spain SL

Juan de la Cierva 19
Elche Parque Empresarial
03203 Elche (Alicante)
+34 965 68 38 40
info@pelsis.es

www.pelsis.es